

# بررسی فعالیت زمین‌ساختی با استفاده از شاخص‌های ریخت زمین‌ساختی در حوضه‌های آبریز حومه شمال شرق استان تهران با رویکرد مدیریت بحران

DOR: <https://dorl.net/dor/20.1001.1.23453915.1402.12.1.8.2>

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۹/۰۹

حسین مرتازی<sup>۱</sup>، محسن پورکرمانی<sup>۲\*</sup>، محمود الماسیان<sup>۳</sup>، سهیلا بوذری<sup>۴</sup>

- ۱- دانشجوی دکتری زمین‌شناسی - گرایش تکتونیک، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
- ۲- استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران. (Mohsen.pourkermani@gmail.com)
- ۳- استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
- ۴- دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

## چکیده

مخاطرات زمین‌شناسی، از جمله بلایای طبیعی است که بی‌توجهی به آن خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. همه‌ساله در کشور ما ایران، به علت موقعیت جغرافیایی و تکتونیک فعال آن، همواره شاهد مخاطرات زیاد با تلفات بالایی روبرو بوده و هستیم. در این مقاله، به بررسی زمین‌ساخت فعال نسبی حوضه‌های آبریز جنوب شرقی البرز مرکزی از طریق تحلیل شاخص‌های مورفومتری پرداخته شد و نتایج حاصل از این ارزیابی‌ها را به صورت شاخص نسبی فعالیت‌های تکتونیک (Iat) ارائه و برای برآورد تکتونیک فعال از نقشه‌های توپوگرافی و نقشه‌های زمین‌شناسی و DEM استفاده شد. همچنین برای تشکیل حوضه‌ها بر روی منطقه مورد مطالعه از نرم‌افزار Arc GIS بر پایه داده‌های حاصل از مدل رقومی ارتفاعی استفاده شده است. نتایج بررسی این ویژگی‌ها با هم نشان می‌دهد سطح فعالیت نسبی تکتونیک منطقه مورد مطالعه به سه رده فعالیت نسبی تکتونیک خیلی بالا، بالا و نسبتاً بالا تقسیم‌بندی شده است. هرچه به سمت خاور و نیز به سمت شمال باختر منطقه که ارتفاعات شهر تهران را شامل می‌شود، حرکت کنیم فعالیت تکتونیک افزایش می‌یابد و نقشه پهنه‌بندی شده آبرفت‌های منطقه نشان می‌دهد که بالآمدگی در عرض‌های بالا رخ داده و رسوبات را در بستر سنگ کف رودخانه به سمت عرض‌های پائین حرکت داده است و این امر ناشی از بالابود تکتونیک فعال نسبی در عرض‌های بالای منطقه است. از این رو تحلیل مخاطرات حوضه‌های آبریز در این ناحیه همواره لازم و ضروری است؛ زیرا بر اساس آن می‌توان در تصمیم‌گیری‌ها و اولویت‌بندی اقدامات مدیریت بحران، گام‌های اساسی را برداشت.

واژه‌های کلیدی: شاخص‌های زمین‌ریختی، زمین‌ساخت فعال، حوضه زهکشی، عدم تقارن، البرز مرکزی

## Tectonic Activity Using Geomorphological Indicators in the Watersheds of Eastern Tehran with a Crisis Management Approach

Hossein Mortazi<sup>1</sup>, Mohsen Pourkermani<sup>2\*</sup>, Mahmoud Almasian<sup>3</sup>, Soheila Bouzari<sup>4</sup>

1. Ph.D. Candidate, Dept. of Geology, Faculty of Basic Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran  
(Mohsen.pourkermani@gmail.com)

2. Prof., Dept. of Geology, Faculty of Basic Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3. Assist. Prof., Dept. of Geology, Faculty of Basic Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4. Assoc. Prof., Dept. of Geology, Faculty of Basic Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

### Abstract

Geological hazards include natural disasters, the neglect of which will lead to irreparable damages. Every year in our country, Iran, due to its geographical location and active tectonics, we have always witnessed many hazards with high casualties. In this article, the investigation of the relative active tectonics of the southeast catchment basins of Central Alborz was done through the analysis of morphometric indicators and the results of these evaluations were presented in the form of the relative index of tectonic activities (Iat) and to estimate the active tectonics of Topographic maps, geological maps, and DEM were used, and Arc GIS software was used to form watersheds on the studied area based on the data obtained from the digital elevation model. The studied area is divided into three categories of relative tectonic activity: very high, high and relatively high. As we move towards the east and also towards the northwest of the region which includes the heights of Tehran city, the tectonic activity increases and the zoned map of alluvium in the region shows that the uplift occurred in high latitudes and deposited the sediments in the bed. The bedrock of the river has moved towards lower latitudes, and this is due to relatively high active tectonics in the upper latitudes of the region. Therefore, it is always necessary to analyze the risks of watersheds in this area. Because based on it, basic steps can be taken in making decisions and prioritizing crisis management actions.

**Keywords:** Geomorphologic Indices of Active Tectonics, Drainage Basin, Asymmetry, Central Alborz.

۱۳۹

شماره ۲۳

بهار و تابستان ۱۴۰۲

دوفصلنامه

علمی و پژوهشی



بررسی فعالیت زمین‌ساختی با استفاده از شاخص‌های ریخت  
زمین‌ساختی در حوضه‌های آبریز حومه / ... حسین مرتازی

## ۱- مقدمه

شهر تهران به‌ویژه منطقه مورد مطالعه به سبب زمین‌شناسی پیچیده‌ای که پشت سر گذاشته، از گوناگونی فراوانی در سیمای ریخت‌شناسی برخوردار است. پهنه البرز نیز به‌عنوان یکی از ایالت‌های ساختاری ایران درگیر این پیچیدگی‌ها است. تاکنون پژوهشگران زمین‌شناس و لرزه‌شناس بسیاری در راه گشودن پیچیدگی‌ها تلاش کرده‌اند و در این گذر جنب‌های بسیاری از ویژگی‌های زمین‌شناختی و زمین‌ساختی البرز آشکار شده است. گستره مورد مطالعه، یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های کوه‌زاد البرز به شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که جایگاه خمش ساختاری، تغییر در رفتار لرزه‌ای و حتی تغییر در فراز توپوگرافی البرز در این بخش از کوه‌زاد قرار رشته‌کوه البرز در حاشیه جنوبی حوضه کاسپین جنوبی با عرض ۱۰۰ کیلومتر و طول ۲۰۰۰ کیلومتر از قفقاز کوچک در شمال باختر تا رشته‌کوه‌های پاروپامیسوز در شمال افغانستان در خاور گسترده است و زمین‌ساخت فعالی را نشان می‌دهد [۱].

در مقیاس ناحیه‌ای، به دست آوردن نرخ زمین‌ساختی یا حتی دانستن اینکه در کدام ناحیه خاص، مطالعات کمی برای تعیین نرخ فعالیت صورت گیرد، مشکل است. در این مقاله، از یک روش کمی بر اساس شاخص‌های زمین‌ریختی، برای تعیین میزان فعالیت زمین‌ساختی حوضه‌های جنوب شرقی البرز مرکزی استفاده شده است. بربریان ۱ این شاخص‌ها در مطالعه زمین‌ساخت فعال نسبی بر اساس تهیه یک شاخص منفرد بسیار مفید شناخته شده‌اند. [۲].

بیشتر بررسی‌های شاخص‌های زمین‌ریختی به محاسبه شاخص‌های خاص در مقیاس منطقه‌ای، مانند حوضه زهکشی یا پیشانی کوه پرداخته‌اند. به‌جز شاخص طول-شیب آبراهه (SL)، بیشتر شاخص‌ها در مقیاس ناحیه‌ای بررسی نشده‌اند [۳]. سیلور و آذر (۲۰۰۳)، زمین‌ساخت فعال نسبی

پیشانی‌های مختلف کوه را در جنوب باختر اسپانیا، با محاسبه شاخص‌های  $V_f$  و  $S_{mf}$  مورد بررسی قرار داد اما در مطالعه خود از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، استفاده نکرده‌اند. [۴، ۵ و ۶]، خاوری (۲۰۰۸)، با توجه به پویایی ناحیه بررسی شاخص‌های مورفوتکتونیک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل‌های ارتفاعی رقومی (DEM) و سایر پارامترهای تکتونیک فعال، نظیر گسل‌های رو رانده ناحیه مورد مطالعه که دارای ۵ حوضه آبریز با راستای شمالی-جنوبی بوده، مناطق دارای فعالیت تکتونیک متفاوت مشخص شده است [۷].

### ۱-۱- مروری بر مطالعات پیشین

این منطقه تاکنون مورد مطالعه اشخاص مختلف، از جنبه‌های متنوع قرار گرفته است. در این قسمت مروری بر پژوهش‌های انجام شده در ناحیه مورد مطالعه داریم.

سربازی و همکاران [۸]، در سال ۱۳۹۵، به ارزیابی فعالیت‌های تکتونیک حوضه‌های حبله رود، حاجی عرب و جاجرود از طریق تحلیل‌های مورفومتری پرداخته و نتایج حاصل از این ارزیابی‌ها را به‌صورت شاخص نسبی فعالیت‌های تکتونیک (Iat) ارائه نمودند. آن‌ها شاخص‌های فعالیت زمین‌ساختی منطقه را در چهار طبقه فعالیت کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد مشخص نمودند. برای برآورد تکتونیک فعال از نقشه‌های توپوگرافی و نقشه‌های زمین‌شناسی و DEM استفاده نمودند و برای تشکیل حوضه‌ها بر روی منطقه مورد مطالعه از نرم‌افزار Arc GIS بر پایه داده‌های حاصل از مدل رقومی ارتفاعی استفاده نموده و پدیده‌هایی مانند پرتگاه‌های گسلی، مخروط افکنه‌های چند نسلی، دره‌های خطی که به‌وفور در حوضه‌های با فعالیت زیاد و متوسط تکتونیک در سه حوضه مشاهده نمودند و به این نتیجه رسیدند که در حوضه‌های مورد مطالعه،

حوضه جاجرود نسبت به دو حوضه دیگر بیشتر تحت تأثیر فعالیت‌های تکتونیکی قرار گرفته است شیرمحمدی و همکاران در سال ۱۳۹۵ به تحلیل ساختاری و جنبشی گستره بین گسل مشاء و گسل شمال تهران به مطالعه پرداخته و در مطالعات ساختاری خود، بین گستره گسل مشاء و گسل شمال تهران چهار رده تعیین نمودند؛ که آن چهار رده عبارت‌اند از: (۱) گسل‌های معکوس با چین‌های همراه با آن‌ها (۲) گسل‌های راست‌الغز راست‌بر (۳) گسل‌های راندگی (۴) گسل‌های عادی. بیشترین ساختارهای گستره، چین‌ها و گسل‌های رده سوم این تقسیم‌بندی هستند که بر اثر ترفشارش چپ‌بر، در پی فشار به صفحه ایران مرکزی به وجود آمده‌اند. با بررسی عکس‌های ماهواره‌ای، بازدیدهای صحرایی و اطلاعات لرزه‌ای و ترکیب این داده‌ها با نتایج ریخت زمین‌ساختی، مدلی برای گستره ارائه نمودند که نشان می‌دهد بر اثر حرکت چپ‌بر گسل‌های مشاء، شمال تهران و دره اویشان، گستره بین این گسل‌ها دچار یک چرخش ساعت‌گرد شده است. این چرخش به‌روشنی در روند چین‌ها قابل‌شناسایی است [۹].

آسیا بر و همکاران (۱۳۹۵)، شاخص‌های زمین‌ریخت‌شناسی را در ناحیه سروستان البرز مرکزی مورد بررسی قرار دادند و این ناحیه را به لحاظ فعالیت‌های زمین‌ساختی طبقه‌بندی نمودند و همچنین نتایج حاصل از مطالعه شاخص‌ها را با بررسی‌های صحرایی سازگار دانسته‌اند [۱۰].

اسکندری و همکاران در سال ۱۳۹۵ با ارائه‌ی مدلی به تحلیل خطر لرزه‌ای بر اساس خطر اصلی لرزش و شکست پرداختند و بیان داشتند که زمین‌بر این اساس با توجه به حجم وسیع داده‌های توصیفی و مکانی، سامانه‌ی نرم‌افزاری باقابلیت‌های تحلیل و استنتاج مکانی و بر مبنای سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS) طراحی و

توسعه‌یافته است. در مدل ارائه‌شده، به‌منظور تحلیل خطر لرزش زمین، از ۲ رابطه‌ی کاهندگی موجود برای کشور استفاده می‌شود که با توجه به عدم قطعیت‌های موجود در وقوع زلزله (شامل اندازه‌ی بزرگی زلزله، عمق کانونی و موقعیت کانون زلزله)، این عملیات به‌صورت تصادفی در هر بار انجام تحلیل انتخاب می‌شود. خروجی‌ها شامل مقادیر بیشینه شتاب، سرعت و تغییر مکان حداکثر زمین محاسبه می‌شود. در مدل ارائه‌شده، به‌منظور تحلیل خطر شکست زمین، بر اساس نوع منطقه و الگوریتم‌های ارائه‌شده، سه خطر ثانوی زلزله (روانگرایی، زمین‌لغزش و گسلش) مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این مرحله با توجه به استعداد روانگرایی و استعداد زمین‌لغزش می‌توان تغییر مکان دائمی ناشی از خطرات روانگرایی و زمین‌لغزش را برای هر جزء و در هر تکرار شبیه‌سازی محاسبه نمود. تمامی این گام‌ها بر اساس شبیه‌سازی مونت‌کارلو، برای لحاظ نمودن عدم قطعیت‌های نهاده هزار بار تکرار می‌شوند و از خروجی‌های موجود در پایگاه داده، میانگین‌گیری می‌شود تا تمامی حالات خرابی در نظر گرفته شود. مدل موجود می‌تواند نقشه‌ی خطر لرزش زمین و شکست زمین را برای هر منطقه تهیه نماید [۱۱].

مفیدی و همکاران، در سال ۱۴۰۱ به رابطه بعدهای فرکتالی آبراهه با خصوصیات مورفومتری حوضه‌ها به مطالعه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از خصوصیات مورفومتری و خصوصیات آبراهه در مدیریت حوزه‌های آبخیز از نظر سیل، فرسایش و حفاظت خاک، می‌توان از مدل‌های فرکتالی برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق‌تر برای مدیریت آبراهه‌ها استفاده نمود [۱۲].

ضرائی در سال ۲۰۱۳ با توجه به اینکه استفاده از هندسه فرکتالی روشی نوین در بررسی خصوصیات شبکه آبراهه‌ها است، پیشنهاد دادند

که در مناطق مختلف با شرایط مورفومترى متفاوت‌تر، حوضه‌ها با تحلیل فرکتالی مورد استفاده قرار گیرند [۱۳].

آرا و همکاران در سال ۱۳۹۱ به ارزیابی دقت و صحت شاخص‌های ژئومورفولوژیکی با استفاده از داده‌های ژئودینامیکی در حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران و در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که فعالیت نو زمین‌ساخت در منطقه مورد مطالعه در همه‌جا یکسان نبوده و در مناطق بالادست، حوضه‌ها فعال‌تر می‌باشند [۱۴].

محمدی و همکاران در سال ۱۳۹۹ از روش تحلیلی و بازسازی زمانی تغییرات و فن‌کاربر مقایسه مورفومترى رودخانه‌ها و دامنه‌های مشرف به دره‌ها به سه روش: مقایسه ارتفاع و ضخامت رسوبات آبرفتی، تعیین حدود گسترش رسوبات رودخانه‌ای و دریاچه‌ای و بازیابی آخرین حد ارتفاعی گدازه‌های مشرف به دره‌ها پرداختند و بیان داشتند که رودخانه هراز به‌طور متوسط، ۴ کیلومتر، رودخانه دلیچای ۳ کیلومتر و رودخانه لار ۲ کیلومتر بر اثر گدازه‌های دماوند به‌مرور و طی فوران‌های متوالی تغییر مسیر داده‌اند. مسیر رودخانه‌ها عمدتاً پس از شکل‌گیری دریاچه‌ها بر اثر انسداد دره‌ها و شکسته شدن سد ایجاد شده‌اند [۱۵].

پیروانی و همکاران در سال ۱۴۰۱ در پژوهش خود از فن شبیه‌سازی تصادفی چشمه گسل محدود، برای شبیه‌سازی جنبش‌های نیرومند زمین برای سناریوی محتمل زمین‌لرزه‌های تهران استفاده نمودند. علاوه بر آن برای شناسایی ویژگی‌های چشمه و مسیر انتشار گسیختگی پارامترهایی را انتخاب نمودند [۱۶].

فدوی و همکاران در سال ۱۳۹۶ در تحقیق خود، با تأکید بر روش‌های تحلیل هندسه فرکتال به‌منظور تشخیص خطواره‌های گسلی پنهان و بررسی پایانه‌های گسلی منسوب به رو راندگی مشاء قشم بر اساس داده‌های ژئوفیزیک هوایی و

۴۰ رویداد لرزه‌ای و استفاده از روش‌های متداول، خطوط پربندی رسم نمودند. پس از اعمال روش‌های تحلیلی برای به‌گزینی مکان هندسی خطواره‌های تاریخی استفاده نمودند. بدین ترتیب ارتباط مناطق زلزله‌خیز شمال شرق استان تهران با الگوی ساختمانی حاکم بر منطقه و با تأکید بر گسل مشاء قشم بررسی و سامانه لرزه‌ای پنهان شناسایی نمودند [۱۷].

علوی و همکاران در سال ۱۳۸۶ در مطالعه لرزه‌خیزی منطقه شمال شرق تهران با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و GIS عنوان نمودند که در خصوص زمین‌لرزه‌های پیش از سده بیستم و نیز رویدادهای لرزه‌ای ثبت‌شده دستگاهی در گستره، نقش بسزایی را در حفظ پایداری سازه‌های در حال احداث دارد. استفاده از ابزارهای جدید همانند داده‌های ماهواره‌ای و ژئوفیزیکی در مطالعات زمین‌ساختی و به‌کارگیری GIS در مراحل تلفیق و تفسیر داده‌ها نتایج را منطقی‌تر و دقیق‌تر ارائه می‌دهد. بررسی نتایج نشان می‌دهد که روند خطواره‌های شاخص به‌دست‌آمده از داده‌های ماهواره‌ای منطبق بر گسل‌هاست که نشان‌دهنده جنب‌بند بودن گسل‌ها و لرزه‌خیزی بالای منطقه است. همچنین وجود گسل مهم و جنب‌بند مشاء در این منطقه نیز تأکیدی دیگر بر توجه بیشتر در ساخت بناهای ضد زلزله در منطقه مورد مطالعه است.

## ۱-۲- روش مطالعه

در روش تحقیق از محاسبه شاخص‌های مورفوتکتونیک و ابعاد فرکتالی گسل‌های لرزه‌ای و مقایسه و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای زیر استفاده شد:

Global Mapper, GIS Arc, ER Mapper  
از مطالعات تلفیقی و تدوین نهایی تهیه نقشه توپوگرافی و داده‌های رقومی و ماهواره‌ای استفاده شد و برداشت‌های صحرایی از موقعیت

دقیق گسل‌ها و زمین‌لغزش‌ها و آبراهه‌ها انجام شد.

به‌طور کلی مهم‌ترین اهداف تحقیق به‌طور خلاصه به شرح زیر است:

نبرد تحقیقات لازم مورفوتکتونیک و هندسه فرکتالی گسل‌ها و کانون‌های لرزه‌ای در گستره مورد مطالعه

مطالعه و بررسی اشکال و فرم‌های موجود مورفوتکتونیک برای مطالعه نیروها و عوامل به وجود آورنده آنها

بررسی و ارزیابی زمین‌ساخت فعال و توسعه توپوگرافی گستره مورد مطالعه با استفاده از شاخص‌های مورفوتکتونیک که فعالیت طولانی مدت پوسته زمین را در خود ثبت کرده‌اند.

شناخت گسل‌های فعال منطقه و ارتباط آنها با مراکز سطحی لرزه‌ای در گستره مورد مطالعه

بررسی ارتباط گسل‌های فعال و مراکز لرزه‌ای در هر حوضه با ناپایداری‌های شیبی در آنها

بررسی شناخت زمین‌ریختی رودخانه‌های مرتبط با عملکرد گسل‌ها در گستره مورد مطالعه

مطالعه تأثیر مختلف نیروهای زمین‌ساختی در لیتولوژی‌های مختلف در گستره مورد مطالعه

انطباق نقشه‌های پهنه‌های تکتونیک فعال با نقشه‌های هندسه فرکتالی گسل‌های لرزه‌ای

استفاده از نقشه‌های پهنه‌بندی تکتونیک فعال برای استفاده در مکان‌یابی و کاهش اثرات منفی

حوادث غیرمترقبه در انجام پروژه‌های عمرانی، شهرسازی، اقتصادی، کنترل سیلاب و هدایت آب‌های سطحی

### ۱-۳- روش تحقیق

خطر عبارت است از پتانسیل تهدیدکننده‌ای که هر لحظه احتمال وقوع آن وجود دارد. این حادثه می‌تواند به‌صورت پدیده‌ای طبیعی باشد و یا توسط بشر ایجاد شود. در مدیریت سوانح، از خطر

به‌منزله‌ی سوانح یاد می‌شود که شایع‌ترین سوانح طبیعی شامل زلزله، سیل، خشک‌سالی، زمین‌

لغزش و آتش‌سوزی است. لذا خسارت‌های وارده به اجزای سازه‌ها، ساختمان‌ها و شریان‌های

حیاتی در اثر مخاطرات زمین‌شناسی متصور است. در این پژوهش سعی شده که با تکیه بر حوضه‌ها و

زیر حوضه‌ها در گستره پردیس (شرق تهران) و محیط پیرامون آن، ابعاد فرکتالی گسل‌ها و

کانون‌های سطحی لرزه‌ای در محدوده‌های با درجه فعالیت تکتونیک مختلف مشخص شده بر

اساس شاخص‌های مورفوتکتونیک مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت نقشه‌های هندسه فرکتالی

گسل‌های لرزه‌ای را با نقشه‌های سطح‌بندی تکتونیک فعال گستره انطباق داده شود.

گستره مورد پژوهش به ۲۵ زون ساختاری به ابعاد ۱۳ کیلومتر در ۱۳ کیلومتر انتخاب شد و

برای محاسبه هندسه فرکتالی گسل‌های لرزه‌ای گستره در محیط GIS ابعاد فرکتالی برای هر زون

مشخص و نتایج در لایه نهایی پهنه‌بندی زمین‌ساخت نسبی گستره ادغام شد. طبق

محاسبات، پتانسیل حرکتی گسل در هر مقطع از گسل‌های ناحیه مشخص شد که گسل‌های مشاء،

لتیان و نیاوران بیشترین پتانسیل حرکتی در مقایسه با دیگر قطعات گسلی است. نتایج

محاسبه پتانسیل حرکت گسل‌ها در هر قطعه، تطابق خوبی را با فراوانی زمین‌لرزه‌های رخ داده

نمایان می‌سازد، به‌طوری‌که بخش خاوری ناحیه مورد مطالعه، دارای نرخ لرزه‌خیزی بیشتری نسبت

به دیگر بخش‌های آن است و تمرکز زمین‌لرزه‌ها بیشتر در بخش جنوب خاوری گسل مشاء در

ناحیه مشخص شده است؛ که می‌تواند در آینده دچار گسلش از نوع شکننده شود. به عبارتی

می‌توان چنین استنباط کرد که گستره مورد پژوهش در مرحله پیش‌لرزه قرار دارد. لذا با

توجه به اینکه این منطقه در آینده محل سکونت

۱۴۳

شماره ۲۳

بهار و تابستان ۱۴۰۲  
دوفصلنامه

علمی و پژوهشی



تعداد زیادی از جمعیت شهر تهران خواهد بود، به‌منظور کاهش خسارات، مستلزم توجه بیشتری است.

تغییر شکل غالب منطقه، به‌صورت بالآمدگی همراه با حرکت چپ‌گرد است، اما تعیین اینکه کدام مناطق نرخ بالآمدگی بیشتری نسبت به حرکت چپ‌گرد دارند، در بررسی‌های لرزه‌خیزی دارای اهمیت ویژه‌ای است. برای می‌بردن به نرخ فرآیند، میزان تأثیر آن در تغییر شکل و نیز یافتن مناطق فعال‌تر به لحاظ بالآمدگی، شاخص‌های ریخت زمین‌ساختی منطقه موردبررسی قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، بررسی شاخص‌های ریخت زمین‌ساختی در مقیاس‌های مختلف داده‌های DEM صورت می‌پذیرد، بنابراین اگر هندسه فرکتالی بر شاخص‌های ریخت زمین‌ساختی مرتبط باشد، نتایج حاصل از تحلیل فرکتالی این شاخص‌ها می‌تواند به‌عنوان اولین بار موردبررسی و تحلیل دینامیکی در این ناحیه در مطالعات بعدی قرار گیرد.

#### ۱-۴- چشم‌اندازها

یکی از مهم‌ترین چشم‌اندازهای این مقاله رودخانه‌ها هستند که به حرکات تکتونیک بسیار حساس می‌باشند و برای ارزیابی تکتونیک فعال ناحیه، مورد مطالعه قرار می‌گیرند، اندازه‌گیری‌ها بر اساس محاسبه شاخص‌های ژئومورفیک و دیگر پارامترها و با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی، عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای و کارهای صحرایی صورت می‌گیرد.

#### ۲- ناحیه مورد مطالعه


علوی، (۱۹۹۱)، حوضه‌های زهکشی گستره مورد پژوهش دارای مساحتی حدود ۳۳۸۸/۱ کیلومتر مربع با موقعیت جغرافیایی  $۲۳^{\circ} ۵۱'$

تا  $۱۳^{\circ} ۵۲'$  طول خاوری و  $۲۸^{\circ} ۳۵'$  تا  $۳۶^{\circ} ۰۵'$  عرض شمالی می‌باشند (شکل ۱). سنگ‌شناسی ناحیه، شامل مجموعه‌ای از سنگ‌های رسوبی پرکامبرین، پالئوزوئیک و مزوزوئیک و ترشیاری و رخمون‌های نامنظمی از سنگ‌های آذرین باسن نه‌چندان دقیق و ترکیب شیمیایی متفاوت است. علوی ساختار البرز مرکزی را یک ساختار دوبلکس مرکب پیچیده با یک هندسه تاق ریخت معرفی کرده است. در دامنه‌های شمالی و جنوبی با گسل‌های معکوس به ترتیب شیب به سمت جنوب و شمال می‌باشند [۱۸].


نظری (۲۰۰۶)، معتقد است که چین‌خوردگی از نوع جدایشی همراه با بالآمدگی رخساره‌های پرکامبرین و پالئوزوئیک در البرز مرکزی روی داده است. رودخانه‌ها در عرض‌های بالای منطقه به دلیل بالآمدگی، بیشترین بخش مسیر خود را بر روی بستر سنگی طی می‌کند و رسوبات آبرفتی را در عرض‌های پایین منطقه بر روی رودخانه‌ها بر جای می‌گذارد. این مسئله نشان می‌دهد که رودخانه‌های عرض‌های بالای ناحیه از نوع سنگ بستری است که در آن، نیروهای فرسایشی بیشتر از نیروهای مقاوم عمل کرده و بیشتر نهشته‌های تولیدشده به عرض‌های پایین منطقه منتقل شده است [۱۹].

#### ۳- تعیین الگوی زهکشی حوضه‌های جنوب شرقی البرز مرکزی با استفاده از مدل ارتفاع رقومی ناحیه

با استفاده از توابع مدل‌سازی و مدل رقومی ارتفاعی (Dem)، در نرم‌افزارهای (Arc GIS) و (Global Mapper) و نیز امکان تعیین حوضه‌ها با استفاده از فایل Dgn منطقه، مساحت آن‌ها و همچنین شبکه آبراهه‌ها وجود دارد. برای این



شکل ۱- موقعیت منطقه مورد مطالعه و اساس تفکیک حوضه‌ها بر مبنای نقشه‌های توپوگرافی ۱:۲۰۰۰۰، تصاویر ماهواره‌ای لند ست ۳۰ و ۱۵ متر، (SRTM(90 m), IRS(5.5 m) و نقشه‌های زمین‌شناسی شرق تهران، تهران - مرزن‌آباد - بلده - دماوند در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰



شکل ۲- موقعیت حوضه‌های منطقه و قسمت‌های کج شده بر اساس شاخص AF

منظور، مدل رقومی ارتفاعی ناحیه مورد مطالعه، با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی با مقیاس‌های ۱:۲۰۰۰۰، به شکل Raster تهیه شد که پس از تجزیه توسط نرم‌افزار، به ۵ حوضه با رودخانه‌های لار، دماوند، جاجرود، سرخه‌حصار به دست آمد. (شکل ۲)، الگوی زهکشی حوضه‌های جنوب شرقی البرز مرکزی را نشان می‌دهد.

۴- شاخص‌های زمین ریختی زمین ساخت فعال همدانی (۲۰۰۸)، مجموعه چند شاخص زمین ریختی می‌تواند برای بررسی زمین ساخت

فعال نسبی مورد استفاده قرار گیرد. [۲۰] این شاخص‌ها می‌تواند به‌عنوان روش کمی برای مطالعه زمین ریختی مرتبط با فرایندهای فرسایشی و رسوب‌گذاری در مجرای رودخانه، نیمرخ طولی و ریخت‌شناسی دره رود، یا سیماهای زمین ساختی مانند پرتگاه‌های گسلی به کار روند. شاخص‌های زمین ساختی قادر به تعیین پهنه‌های مختلفی که در نتیجه تغییر محلی فعالیت زمین ساختی ایجاد شده‌اند، هستند. در این پژوهش، شش شاخص زمین ریختی در حوضه‌های جنوب شرقی البرز مرکزی مورد

بررسی قرار گرفت و نتایج مربوط به هر شاخص بر اساس مقادیر به‌دست‌آمده برای آن شاخص با توجه به مطالعات (Hamdouni et al. 2008) منطقه مورد مطالعه به سه رده فعالیت زمین ریختی تقسیم شد. میانگین رده‌های تمام شاخص‌های مربوط به هر حوضه محاسبه شده و خود به دو رده فعالیت زمین‌ساختی تقسیم شد (جدول ۱) و نقشه رده‌بندی تکتونیک فعال نسبی (Iat) آن تهیه شد [۲۱].

#### ۴-۱- شاخص طول-شیب رودخانه (SL)

هاک (۱۹۷۳) شاخص طول - شیب رودخانه توسط Hack (1973) [22]، به شکل زیر توصیف شد.

$$SI = (\Delta h / \Delta l) * 1$$

در این رابطه  $\Delta h / \Delta l$  شیب بخشی از مجرا و  $l$  طول مجرا از بالادست تا نقطه‌ای که برای آن شاخص محاسبه می‌شود، است. این شاخص برای ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی مفید است. [۲۲] زمانی که رودخانه‌ها و آبراهه‌ها در نواحی با نرخ بالآمدگی زیاد جریان دارند، مقدار SL افزایش می‌یابد، درحالی‌که وقتی جریان رودخانه به موازات ساختارهایی مانند دره‌های حاصل از گسل امتداد لغز صورت گیرد، میزان SL کاهش می‌یابد [۲۳]، کلاسر ۲، پتر، پینتر (Keller and Pinter, 2002) مقادیر این شاخص در ناحیه مورد مطالعه با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی محاسبه شد. این شاخص مقادیر قابل اتکایی را در ناحیه مورد مطالعه نشان نمی‌دهد. به دلیل ساختارهای موجود و مقاومت بالای سنگ‌های منطقه که بیشتر سنگ‌های آتشفشانی آندزیت، تراکی آندزیت و طوف‌های ضخیم لایه می‌باشند [۲۴] و مقادیر بالای شاخص (SL) به شدت تحت تأثیر لیتولوژی منطقه از جمله

سنگ‌های مخروط آتشفشانی دماوند قرار گرفته‌اند. نقشه پهنه‌بندی تکتونیک فعال نسبی بر اساس این شاخص نشان می‌دهد که عرض‌های بالای منطقه دارای فعالیت نسبی تکتونیک بالا می‌باشند (شکل ۳).

#### ۴-۲- شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی (Af)

هیر ۳ (۲۰۰۳)، محاسبه این شاخص روشی برای تعیین میزان کج شدگی زمین‌ساختی در مقیاس حوضه زهکشی است این روش ممکن است برای نواحی به نسبت بزرگ استفاده شود (Hare et. al., 2002)، (Salvany, 2004)، شاخص Af بر اساس رابطه زیر محاسبه می‌شود:


$$Af = 100(Ar / At)$$

در این رابطه  $Ar$  مساحت سمت راست حوضه (دید به سمت پایین‌دست) و  $At$  مساحت کل حوضه است. اگر حوضه‌ای در شرایط پایدار بدون کج شدگی یا با مقدار کم باشد، شاخص  $Af$  برابر ۵۰ است. این شاخص به تغییر میزان کج شدگی در راستای عمود بر روند مجرا حساس است. مقادیر بیشتر یا کمتر از ۵۰ نشان‌دهنده کج شدگی حوضه است که می‌تواند در نتیجه فعالیت زمین‌ساختی یا ساختارهای حاصل از ویژگی‌های سنگ‌شناسی باشد. نتایج نشان داده در جدول ۲ شامل مقادیر  $Af-50$  است که مقدار انحراف از حالت پایدار را نشان می‌دهد. مقادیر  $Af$  از پایین تا بالا برای ناحیه مورد بررسی تغییر می‌کند. بیشترین مقدار این شاخص در بخش جنوب غربی حوضه به‌دست‌آمده است. این در حالی است که حوضه دو دارای بیشترین تقارن است. موقعیت حوضه‌های منطقه و قسمت‌های کج شده بر اساس این شاخص در شکل ۲ مشاهده می‌شود [۲۵].



جدول ۱- رده‌بندی Iat

assessment	Iat calss	S/n	Class of					Basin	Ref. No.
			mf	v/f	Hi	Af	SL		
High	۲	۱/۶۰	۲	۲	۱	۱	۲	۲	۱
Moderate	۳	۲/۰۰	-	۳	۱	۳	۱	۱	۲
Modereate	۳	۲/۳۳	-	-	۳	۱	۳	۳	۳
Moderate	۳	۲/۰۰	۲	۳	۱	۱	۳	۳	۴
High	۲	۱/۶۰	۲	۱	۱	۲	۲	۲	۵




شکل ۳- پهنه‌بندی تکتونیک فعال نسبی بر اساس شاخص SL

#### ۳-۴- انتگرال فراز سنجی (Hi)

همدانی (۲۰۰۸)، انتگرال فراز سنجی شاخصی است که پراکندگی ارتفاع را در یک ناحیه خاص نشان می‌دهد. به‌طور معمول انتگرال برای یک حوضه زهکشی خاص محاسبه می‌شود و مستقل از مساحت آن حوضه است. رابطه ساده‌ای که برای محاسبه این شاخص استفاده می‌شود؛ که رابطه ویلسون ۴ به شکل زیر است.

$$Hi = \frac{\text{average elevation} - \text{min.elevation}}{\text{max.elevation} - \text{min.elevation}}$$

همدانی (۲۰۰۷)، داده‌های لازم برای محاسبه انتگرال فرازسنجی از مدل ارتفاعی-رقومی ناحیه تهیه می‌شود. ارتفاع میانگین از انتخاب ۵۰ نقطه ارتفاعی به‌طور تصادفی در حوضه به دست می‌آید. مقدار این شاخص برابر مساحت زیر سطح منحنی فراز سنجی است. انتگرال فراز سنجی به‌طور مستقیم با زمین فعال رابطه ندارد. مقادیر بالای این شاخص مربوط به نواحی فعال و جوان زمین-ساختی است. درحالی‌که مقادیر پایین آن با نواحی قدیمی که دچار فرسایش زیاد شده و



شکل ۴- پهنه‌بندی تکتونیک فعال نسبی بر اساس شاخص Hi

با توجه به این که مقدار بالآمدگی با میزان فرو کوی دره مرتبط است [۲۶]، بناترین مقدار پایین Vf مربوط به نواحی با نرخ بالآمدگی زیاد است. در ناحیه مورد مطالعه در عرض‌های بالای حوضه‌ها دره‌های V شکل مشاهده می‌شود و میزان این شاخص برای دره‌های اصلی محاسبه شد [۲۷].

محاسبه Vf در فاصله مشخصی از پیشانی گسلی صورت می‌گیرد. در حوضه‌های جنوب شرقی البرز مرکزی این فاصله ۵۰۰m برای همه حوضه‌ها رعایت شده است (شکل ۵). تغییرات عددی این شاخص بین ۰/۰۶ در دره‌های منتهی به حوضه زهکشی رودخانه جاجرود در حوضه یک و ۲/۶۸ در جنوب رودخانه جاجرود در حوضه چهار به دست آمد. کم‌وبیش تمام ناحیه، به جز بخش جنوبی پایین دست حوضه و بخش جنوبی حوضه شمال باختر ناحیه، مقادیر Vf بالایی را نشان می‌دهند [۲۸].

#### ۴-۵- پیچ‌وخم پیشانی کوه (Smf)

(بل ۶، مفادن ۱۹۷۸،۷)، شاخص پیچ‌وخم پیشانی کوه بر اساس رابطه زیر محاسبه می‌شود.


کمتر تحت تأثیر زمین‌ساخت فعال و جوان زمین‌ساخت قرار گرفته‌اند، مرتبط است (Hamdouni et al. 2007) در منطقه مورد بررسی، منحنی‌های فراسنجی برای حوضه‌های منطقه مورد مطالعه توسط نرم‌افزار excel رسم و مقادیر انتگرال فراز سنجی برای ۶ حوضه در ناحیه مورد بررسی، با محاسبه مساحت زیر سطح منحنی‌های فراز سنجی به دست آمد، پهنه‌بندی تکتونیک فعال نسبی بر اساس این شاخص در شکل ۴ آورده شده است.

#### ۴-۴- نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن (Vf)


همدانی (۲۰۰۸)، سیلوا ۵ Vf به‌عنوان نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن به شکل زیر توصیف شده است:

$$Vf = 2Vfw / [(Eld - Esc)] + (Erd - Esc)$$

در این رابطه Vf عرض کف دره، Eld ارتفاع دیواره سمت چپ دره، Erd ارتفاع دیواره سمت راست دره و Esc ارتفاع میانگین کف دره است. مقدار این شاخص برای دره‌های U شکل، بالا و برای دره‌های باریک و تند V شکل، پایین است.



شکل ۵- موقعیت مناطق برداشت Vf



شکل ۶- موقعیت نقاط E برداشت Smf

۱۴۹  
شماره ۲۳  
بهار و تابستان ۱۴۰۲  
دوفصلنامه  
علمی و پژوهشی



بررسی فعالیت زمین‌ساختی با استفاده از شاخص‌های ریخت  
زمین‌ساختی در حوضه‌های آبریز حومه ... / حسین مرتزازی

۱/۴ پیشانی‌های فعال زمین‌ساختی را نشان می‌دهد. روسیول (Rocllwell et al. 1985; Keller, 1986) درحالی‌که مقادیر بیشتر از ۳ به پیشانی‌های غیرفعال مربوط است که در آن‌ها پیشانی‌گسل بیش از ۱ کیلومتر دچار فرسایش شده است (Bull and McFadden, 1977) در این مقاله ۵ پیشانی‌گسلی موازی با روند رشته‌کوه البرز و گسل‌های اصلی و رو رانده مشاء و شمال تهران، مورد بررسی قرار گرفتند (شکل ۶). نتایج به دست آمده بین ۱/۱۳ تا ۱/۶۲ تغییر

(Bull & McFadden, 1977; Bull, 1978)

$$Smf = Lmf / Ls$$

در این رابطه  $Lmf$ ، طول پیشانی کوه در دامنه آن، یعنی جایی که شیب بین کوه و حوضه پیشانی تغییر می‌کند، است و  $Ls$  طول مستقیم پیشانی کوه است. مقادیر برابر ۱ این شاخص، خاص نواحی فعال زمین‌ساختی است، درحالی‌که اگر نرخ بالا آمدگی کاهش یابد و فرایندهای فرسایشی شروع به تشکیل یک پیشانی نامنظم کنند، مقدار  $Smf$  افزایش می‌یابد. مقادیر کمتر از

می‌کند. کمترین مقدار Smf به گسل مشاء در شرق و جنوب شرقی حوضه ۵ جنوب شرقی البرز در حالی است که چهار جبهه کوهستانی از این ۵ جبهه در رده یک تکتونیکی قرار دارند [۲۹].

#### ۴-۶- شاخص تقارن توپوگرافیکی عرضی حوضه (T)

محاسبه این شاخص روشی برای ارزیابی یک رودخانه درون حوضه و تغییرات میزان نامتقارنی در بخش‌های مختلف دره است. خط میانی حوضه جایی است که رودخانه به صورت متقارن نسبت به دره قرار گرفته است و با توجه به طول‌ترین محور حوضه رسم می‌شود. برای هر بخش رودخانه، عبارت از نسبت فاصله بین خط میانی تا رودخانه فعال (Da) به فاصله خط میانی تا مرز حوضه (Dd) است:


$$T = Da/Dd$$

مقدار این شاخص بین ۰ و ۱ متغیر است که کمترین و بیشترین عدم تقارن حوضه را نشان می‌دهد. محاسبه این شاخص در منطقه نشان می‌دهد که در اکثر قطعات، حوضه زهکشی دچار کج شدگی است و از نظر مقدار T این مقدار از

مرکزی مربوط است. همه جبهه‌های موجود در منطقه در رده جبهه‌های فعال قرار می‌گیرند، این ۰/۴۱ برای حوضه سه تا ۰/۵۹ برای حوضه‌های یک و چهار در تغییر است. محاسبه این شاخص در عرض‌های بالایی و پایینی ناحیه مقدار بالایی را نشان می‌دهد (شکل ۷).

#### ۵- بحث

در این مطالعه رده‌بندی تکتونیک فعال نسبی که اولین بار توسط همدانی ( Hamdouni et al. 2008) ارائه شده، برای ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی (Iat) حوضه‌های جنوب شرقی البرز مرکزی استفاده شد. شاخص‌های مختلف زمین ریختی که برای هر حوضه محاسبه شده‌اند، به ۳ رده تقسیم شده‌اند که رده ۱ فعالیت بالا و رده ۳ فعالیت پایین را نشان می‌دهد. شاخص‌های زمین‌ساخت فعال نسبی (Iat) با میانگین‌گیری از رده‌های شاخص‌های زمین ریختی در هر حوضه، (S/n)، محاسبه و خود به دو رده تقسیم شد که رده ۲ فعالیت زمین‌ساختی بالا با S/n بین ۱/۵ تا ۲؛ و رده ۳ فعالیت زمین‌ساختی متوسط با S/n




شکل ۷ - موقعیت مناطق برداشت شاخص T

بین ۲ تا ۲/۵؛ را نشان می‌دهد. ( Hamdouni et al. 2008). میانگین شاخص‌های زمین ریختی (S/n) و مقادیر زمین‌ساخت فعال نسبی (Iat) برای پنج حوضه در ناحیه مورد مطالعه در جدول ۱ آمده است و این نتایج به صورت مدلی از فعالیت زمین‌ساختی نسبی در شکل ۸ نشان داده شده است. پراکندگی شاخص‌های نواحی مرتبط با پیشانی‌های گسلی مختلف و در نتیجه نرخ‌های مختلف فعالیت زمین‌ساختی را نشان می‌دهد. بیش از نیمی از مساحت ناحیه مورد مطالعه را پهنه‌های با فعالیت زمین‌ساختی نسبی متوسط تشکیل می‌دهند. بر اساس مدل ارائه شده، ۲ پهنه زمین‌ساختی در ناحیه مورد مطالعه قابل تشخیص است.

۱- پهنه با فعالیت زمین‌ساختی نسبی بالا: حوضه‌ها و ساختارهای موجود در این پهنه همگی روندی شمال باختر، جنوب خاور را دارا می‌باشند. از ساختارهای اصلی و موجود در این پهنه، گسل مشاء و گسل شمال تهران است که پیشانی‌های گسلی فعالی را با بیشترین میزان پیچ‌وخم تشکیل می‌دهند و همچنین مخروط افکنه‌هایی را در مجاورت پیشانی کوهستانی نشان می‌دهد، Iat مقادیر بالا را نشان می‌دهد که نمایانگر زمین-

ساخت فعال آن است. پیشانی‌های گسلی مستقیم و زهکش‌های فروکاو شده ژرف به خوبی پرتگاه‌های با ارتفاع زیاد را مشخص می‌نمایند. باز دیده‌های صحرایی نشانگر وجود دره‌هایی تنگ و باریک و تراکم شکستگی‌ها و وجود گسل‌های کوچک معکوس در نزدیکی روستاهای لواسان کوچک و بزرگ، برگ جهان، نیکنام ده، چهارباغ و علائین که شاخه‌هایی از گسل‌های اصلی شمال تهران و مشاء می‌باشند را نشان می‌دهد که شاهدهی بر فعال بودن ناحیه است. فعالیت‌های لرزه‌ای مکرر در این ناحیه و مرکز کانونی این زلزله‌ها بر روی گسل مشاء شاهدهی بر وجود منطقه‌ای با فعالیت زمین‌ساختی بالا است [۳۰].

۲- زون با فعالیت زمین‌ساختی متوسط: اغلب در بالادست حوضه‌های زهکشی نسبت به پایین- دست آن‌ها تحت تأثیر فرسایش فعال و بالآمدگی سریع سنگ‌ها قرار دارند. واریزه‌های جوان و مخروط افکنه‌ها و وجود فعالیت آتشفشانی، مخروط آتشفشانی دماوند و نیز گسل‌های کوتاه‌تری که طبقات نا مقاوم نهشته‌های سازند آبرفتی هزار دره را جابه‌جا کرده‌اند، به‌طور کامل فعالیت متوسط را نشان می‌دهند. وجود مقادیر مختلف شاخص‌ها در این زون به شدت تحت تأثیر



شکل ۸ - نقشه پراکندگی شاخص زمین‌ساختی نسبی (Iat) در حوضه‌های جنوب شرقی البرز مرکزی

سنگ‌های آتشفشانی دماوند از جمله تراکی آندزیت، آندزیت و طوف‌های ضخیم لایه قرار گرفته‌اند. همچنین حوضه جنوب باختر منطقه یک حوضه کامل از لحاظ مورفومتری به حساب نمی‌آید؛ به دلیل آنکه تمام حوضه در دشت تهران واقع است و به دلیل ساخت‌وسازها و دست‌کاری‌های بشر آن را از حالت طبیعی خارج کرده است. میزان کج شدگی رودخانه‌ها در هر پهنه با مقدار فعالیت زمین‌ساختی نسبی و در نتیجه عملکرد گسل‌های آن بخش متناسب است. توصیف متوسط از سیمای زمین‌ساختی ناحیه به خوبی با نتایج به دست آمده از شاخص‌های زمین‌ساخت فعال نسبی منطبق است [۳۱].


شاهد دیگر برای مدل رده‌بندی زمین‌ساخت نسبی حوضه‌های جنوب شرقی البرز مرکزی، بردارهای عدم تقارن حوضه و جبهه‌های فعال کوهستانی و نیز مقادیر به دست آمده از رده‌بندی نسبی تکتونیک فعال (Iat) است و نیز جهت کج شدگی در بخش‌های مختلف حوضه‌ها است که اکثر حوضه‌ها به سمت باختر کج شده‌اند. به غیر از حوضه جنوب خاور ناحیه که به سمت خاور کج شدگی شدیدی را نشان می‌دهد. شاخه‌های حوضه جنوب باختر ناحیه به سمت N با توجه به شواهد ژئومورفیکی کج شدگی شدیدی را نشان می‌دهند و با توجه به مقادیر به دست آمده به سمت W کج شده‌اند و در نهایت در پایانه رودخانه سرخه حصار وارد دشت تهران می‌شوند، میزان کج شدگی رودخانه‌ها در هر پهنه با مقدار فعالیت زمین‌ساختی نسبی و در نتیجه عملکرد گسل‌های آن بخش متناسب است. همچنین با توجه به شاخص هیپسومتری مشخص شد که فعالیت همه حوضه‌ها مقادیر حد وسطی را نشان می‌دهند، در عین حال حوضه‌هایی که به مخروط آتشفشانی دماوند نزدیک‌ترند از لحاظ فعالیت تکتونیک کمی بیش از حوضه‌هایی هستند که از آن به سمت

باختر فاصله گرفته‌اند، این در حالی است که فعالیت حوضه‌های دو، سه و چهار به یکدیگر نزدیک‌اند. به دلیل نزدیکی به ولکانیسم‌های کوه آتشفشانی دماوند و به دلیل مجاورت با گسل‌های مشاء و شمال تهران و نیز مقادیر به دست آمده از شاخص زمین‌ساخت نسبی (Iat)، محاسبه شاخص Vf نشان می‌دهد منطقه مورد مطالعه از لحاظ این شاخص بسیار فعال است. بیشتر دره‌ها در بالادست حوضه‌ها V شکل و در پایین دست U شکل می‌باشند و هر چه از سمت باختر به سمت خاور حرکت کنیم، بالآمدگی زیاد و تکتونیک فعال می‌شود [۳۲].

در عرض‌های بالایی، حوضه‌ها دارای چین‌خوردگی نامتقارن همراه با گسلش‌اند که یال شمالی آن‌ها داری شیب کمتری نسبت به یال جنوبی آن‌ها است و در بعضی مواقع یال جنوبی آن‌ها برگشته‌اند. چین‌خوردگی‌ها میل دارند و شیب سطح محوری آن‌ها به سمت شمال است و هر چه از شمال به سمت جنوب حوضه پیش می‌رویم، چین‌خوردگی همراه با گسلش کمتر دیده می‌شود که نشان‌دهنده کاهش فعالیت نسبی تکتونیک به سمت جنوب و افزایش فعالیت نسبی تکتونیک در عرض‌های بالای منطقه است. وجود دامنه‌های واریزه‌ای جوان و قدیمی و نهشته‌های فروریخته و سنگریزه در عرض‌های بالا شاهدهی برای آن است [۳۳].

## ۶- نتیجه‌گیری

مخاطرات زمین‌شناسی به منزله پدیده‌های طبیعی پیوسته در طول تاریخ باعث خرابی‌ها و از بین رفتن جان انسان‌های زیادی شده است. برنامه‌ریزی مناسب برای پیشگیری با کاهش آثار مخرب این پدیده‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و شناسایی و پیش‌بینی نحوه‌ی عمل و نوع تأثیرگذاری آن به مدیران کمک می‌کند تا با



شکل ۹ - نقشه آبرفت‌ها، مخروط افکنه‌ها، زمین‌لغزش‌ها و پادگانه‌های آبرفتی جوان و قدیم منطقه (اقتباس سازمان زمین‌شناسی کشور)

نوینی از گسل‌های ناحیه و روش‌های مختلف برای بررسی فعالیت گسل‌ها و حوضه‌های آبریز در ناحیه، به منظور مطالعات بعدی سازمان مدیریت بحران انجام شده است.

شاخص‌های زمین‌ریختی، روش مفیدی برای بررسی میزان فعالیت زمین‌ساختی فراهم می‌آورند.

مقایسه شاخص‌های عدم تقارن در حوضه‌های زهکشی ناحیه به‌طور آشکار با میزان و رده‌بندی فعالیت زمین‌ساختی نسبی همخوانی دارد و فعالیت بالای زمین‌ساخت نسبی با نواحی که ارتفاع 3313m از سطح دریا وارد بخش‌های مرکزی ناحیه می‌شود، دارای بیشترین فعالیت زمین‌ساختی است. نقشه آبرفت‌ها، مخروط افکنه‌ها، زمین‌لغزش‌ها و پادگانه‌های آبرفتی جوان و قدیم منطقه را در شکل ۹ نشان می‌دهد که رودخانه جاجرود به دلیل بالآمدگی آبرفت‌های موجود در آن از بالادست حوضه در بستر سنگ کف رودخانه به سمت پایین دست، حرکت کرده است که این امر ناشی از بالابود تکتونیک فعال نسبی در عرض‌های بالای منطقه است. احتمال می‌رود روند حرکتی گسل‌های فعال و توان لرزه-ای آن‌ها تأثیر مستقیمی روی حوضه‌های آبریز ناحیه داشته و به‌وسیله آن، حوضه‌ها کنترل

نوشتن سناریوهای دقیق‌تری از روند بحران و نیز کنترل آن اقدام نمایند و در نتیجه سرعت عملکرد خود را در مهار بحران در حد زیادی بالا ببرند. لذا نتایج پیش‌بینی محدوده مورد مطالعه در چهارچوب تحلیل خطر می‌تواند ابزار مناسبی در مدیریت خطر و کاهش خسارت احتمالی در این منطقه باشد.

در این مقاله سعی بر آن شد که از مدیریت بحران برای تدابیر اتخاذ شده در ارتباط با حوادث زمین در شهر و حومه تهران بهره بگیریم. همچنین با بررسی پارامترهای فعال و تصویر رودخانه‌ها میزان بالای کج شدگی را به دلیل بالآمدگی شدید نشان می‌دهند و همچنین ساختارهای فعال موجود در هر حوضه منطبق است. پس از بررسی شاخص‌های زمین‌ریخت-شناسی و محاسبه شاخص Iat در منطقه بررسی شده که بر اساس آن دو پهنه با ویژگی‌های متفاوت به لحاظ زمین‌ساخت نسبی شناسایی شد. با توجه به مقادیر به‌دست آمده از شاخص‌های زمین‌ریختی حوضه‌های یک و پنج دارای بیشترین فعالیت زمین‌ساختی است و در رده دو فعالیت بالای (Iat) قرار می‌گیرند و همچنین بر اساس شواهد صحرایی حوضه شمال باختر ناحیه که از ارتفاعات کوه‌های جنوبی البرز مرکزی از

می‌شوند. همچنین فعالیت گسل‌های پیرامون ناحیه پردیس (شرق تهران) بر تکامل حوضه‌های آبریز اثرگذار بوده است؛ و حضور ساختارهای تکتونیکی فعال در این منطقه باعث بالا بردن سطح فعالیت نسبی تکتونیکی این منطقه شده است.

محتمل است که هندسه گسل‌ها و روند تنش‌های ناحیه مطالعاتی ارتباط مستقیم بالند فرم‌ها و ساختارهای تکتونیکی جوان ناحیه و همچنین شبکه حوضه‌های آبریز منطقه داشته باشد و به نظر می‌رسد ابعاد فرکتالی گسل‌های فعال و کانون‌های سطحی لرزه‌ای در گستره مورد مطالعه یکسان نیست.

نتیجه اینکه ابعاد هندسه فرکتالی گسل‌های فعال و کانون‌های لرزه‌ای سطح‌بندی نسبی فعالیت تکتونیکی بر پایه شاخص‌های مورفوتکتونیک را، تأیید می‌کند و نقشه‌های پهنه بندی آبرفت‌های منطقه نشان می‌دهد که بالاآمدگی در عرض‌های بالا رخ داده و رسوبات را در بستر سنگ کف رودخانه به سمت عرض‌های پائین حرکت داده است و این امر ناشی از بالابود تکتونیک فعال نسبی در عرض‌های بالای منطقه است [۳۴].

برخی از فعالیت‌های نسبی بالای تکتونیکی در عرض‌های بالای منطقه مربوط به ساختارها است. از جمله جوان‌ترین مخروط‌افکنه همراه با بالاآمدگی در مجاورت پیشانی کوهستان در یک ناحیه و همچنین زمین‌لغزش‌های جدید در قسمتی از منطقه وجود دارد که همگی متأثر از گسل‌های رو رانده منطقه می‌باشند [۳۵].

وجود فعالیت‌های لرزه‌ای و نرخ بالای فعالیت‌های تکتونیکی منطقه حاکی از آن است که منطقه در حال تجمع تنش‌ها و دارای توان لرزه‌خیزی در آینده است. با توجه به سرعت متوسط لغزش گسل‌های ناحیه در سال‌های اخیر و همچنین با توجه به مطالعات پیشین و نتایج

به‌دست‌آمده از ناحیه و داده‌های حاصل از محاسبه مقادیر پتانسیل حرکتی گسل، بخش خاوری ناحیه (حدفاصل گسل مشاء تا گسل نیاوران) بیشترین میزان احتمال لغزش در آینده را دارا است. بخش جنوبی گسل نیاوران با بیشترین میزان پتانسیل حرکتی گسل همراه است و ساختارهای تکتونیکی نواحی آن به‌عنوان جوان‌ترین فعالیت‌های نئوتکتونیکی در ناحیه معرفی می‌شود [۳۶].

## ۷- پیشنهادها

با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه در آینده محل سکونت تعداد زیادی از مردم خواهد بود، به منظور کاهش خسارات احتمالی، باید مستلزم توجه بیشتر مدیران و کارشناسان واقع‌شده تا با ارائه تصمیم و راهکار مناسب از اثرات مخرب احتمالی، بکاهند. مسئولین برای کاهش خسارت‌ها در پروژه‌های عمرانی و اتفاقاتی نظیر زمین‌لرزه‌ها، فرونشست زمین، زمین‌لغزش‌ها، حرکات دامنه‌ای، سیلاب‌ها و ... نیازمند به تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی ژئوتکنیکی دقیق می‌باشند. این نقشه‌ها با فراهم کردن اطلاعات تفصیلی از مشخصات فیزیکی و مکانیکی بستر، علاوه بر اینکه نوعی پیش‌آگاهی در خصوص شرایط پهنه‌های مختلف منطقه ارائه خواهد کرد، می‌تواند دورنمایی از نقاط مستعد برای اجرای پروژه‌های عمرانی خاص نیز به‌دست‌آمده دهد. در واقع، می‌توان به کمک این نقشه‌ها، شرایط انواع ساخت‌وسازهای شهری در نقاط مختلف را بررسی و با توجه به شرایط لایه‌های خاک، بهترین شکل توسعه شهری را در پیش گرفت. در فاز مطالعات اولیه از طراحی یک پروژه عمرانی، اطلاعات دقیقی از جنس و مقاومت خاک، شیب، توپوگرافی، سطح آب زیرزمینی، محل احداث و ... موردنیاز است و بهره‌گیری از سیستم اطلاعات مکانی در جمع‌آوری این اطلاعات و نهایتاً، تهیه



Quarterly Journal Geo sciences vol. 19, No. 75, spring 2010. Pages 67 to 74.

۸. سربازی، زهرا، ثروتی، محمدرضا، مقصودی، مهران، سبک خیز، فاطمه (۱۳۹۵) تحول فعالیت‌های تکتونیکی در حوضه‌های حبله رود و جاجرود با استفاده از روش‌های مورفومتری

۹. شیرمحمدی، مهیا، علوی، سید علی، قاسمی، محمدرضا، احتشامی، محسن (۱۳۹۵) تحلیل ساختاری و جنبش‌های گستره بین گسل مشاء و گسل شمال تهران فصلنامه پژوهش‌های دانش زمین شماره ۶۲

10. Asiabar, S. H, and Bagheriyan, S, (2017)- Exhumation of the Deylaman fault trend and its effects on the deformation style of the western.8

Alborz belt in Iran. International Journal of Earth Sciences, pp 1-13.

۱۱. اسکندری، محمد، امیدوار، بابک، مدیری، مهدی، نکویی، محمدعلی، آل شیخ، علی‌اصغر (۱۳۹۷) ارزیابی مدل تهیه نقشه‌ی خطر لرزه‌ای در سیستم اطلاعات مکانی با در نظر گرفتن عدم قطعیت و فصلنامه علمی پژوهشی

مدیریت بحران شماره چهاردهم پاییز و زمستان

۱۲. مفیدی، الهام، معینی، ابوالفضل، پذیرا، ابراهیم، احمدی، حسن (۱۴۰۱) رابطه بعدهای فرکتالی آبراهه با خصوصیات مورفومتری حوضه، فصلنامه حفاظت منابع آب‌و‌خاک ۱۴۰۱ دوره ۱۱ شماره ۳ و فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران شماره چهاردهم

13. Zarnani, S, (2013)- Earthquake load attenuation using EPS geofom buffers in rigid wall applications. Indian Geotechnical Journal; 43(4),pp 283-291.

۱۴. آرا، هایده، شایانی، سیاوش، یمانی مجتبی (۱۳۹۱) ارزیابی دقت و صحت شاخص‌های ژئومورفولوژیکی با استفاده از داده‌های ژئودینامیکی در حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی ۱۳۹۱، دوره: ۲۳، شماره: ۱۲۲

۱۵. محمدی، ابوطالب وی‌مانی، مجتبی و مقیمی، ابراهیم و گورابی، ابوالقاسم و زمان زاده، سید محمد، (۱۳۹۹)، بازسازی تغییرات شبکه هیدرو گرافی پیرامون دماوند بر اساس داده‌های مورفومتری و رسوب‌شناسی، مقالات فصلنامه پژوهش دانش زمین، دانشگاه شهید بهشتی دوره ۱۱ شماره ۲۱۳

۱۶. پیروانی، مریم، سدیدی خوی، احمد، (۱۴۰۱)، مریم و سدید خوی، احمد، پیش‌بینی جنبش‌های نیرومند زمین برای سناریو محتمل زمین‌لرزه تهران، مطالعه موردی گسل‌های شرق تهران بیستمین اجلاس ژئوفیزیک ۱۴۰۱، پیش‌بینی جنبش‌های نیرومند زمین برای سناریو محتمل زمین‌لرزه تهران: مورد مطالعه گسل شمال تهران، بیستمین اجلاس ژئوفیزیک ۱۴

۱۷. فدوی، پریسا و ایزدی، رؤیا، ۱۳۹۷، کاربرد هندسه

نقشه‌های پهنه‌بندی پارامترهای مقاومتی برای استفاده هم‌زمان از داده‌های مختلف باعث کاهش هزینه انجام مطالعات می‌شود. لذا با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه در آینده محل سکونت تعداد زیادی از مردم خواهد بود، به‌منظور کاهش خسارات احتمالی، باید مستلزم توجه بیشتر مدیران و کارشناسان واقع‌شده تا با ارائه تصمیم و راهکار مناسب از اثرات مخرب احتمالی بکاهند.

## ۸- قدردانی

نویسندگان مقاله از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای کمک در تهیه داده‌ها کمال تشکر را دارند.

## ۹- منابع

1. Stöcklin, J. 1974- Northern Iran: Alborz Mountains. In: Spencer, A. (Ed.) Mesozoic – Cenozoic Orogenic Belts: Data for Orogenic Studies. Geological Society Special Publication, London 4, pp. 213-234.1
2. Berberian, M. Yeatz, R. s. 2001- Contribution of archeological data to studies of earthquake history in the Iranian Plateau. Journal of Structural Geology 23, 563
3. R. El Hamdouni, C. Irigaray, T. Fernandez, J. Chacon, E.A. Keller. 2007 – Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain). Received 24 January
4. Azor, A. Keller, E.A. Yeats, R. S. 2002- Geomorphic indicators of avtiwv fold growth: South Mountain- Oak Ridge Ventura basin, southern California. Geological Society of America Bulletin 114, 745-753. sed form 31 July 2007; accepted 1 August 2007, Available online 15 August 20References
5. Keller, E.A. Yeats, R. S. 2002- Geomorphic indicators of avtiwv fold growth: South Mountain- Oak Ridge Ventura basin, southern California. Geological Society of America Bulletin 114, 745-753. sed form 31 July 2007; accepted 1 August 2007, Available online 15 August 20References
6. Silva, P.G. Goy, J. L. Zazo, C. Bardajm, T. 2003- Fault generated mountain fronts in southeast Spain: geomorphologic assessment of tectonic and earthquake activity. Geomorphology 250, 203-226.
7. R. K.havari, M. Ghorashi, M. Arian, Kh. Khosrotehrani. 2008. Geomorphi signatures of Active Tectonics in the Karaj drainage Basin in south central Alborz, N Iran. Scientific

۱۵۵

شماره ۲۳

بهار و تابستان ۱۴۰۲

دوفصلنامه

علمی و پژوهشی



زمین‌ساختی در حوضه‌های آبریز حومه /... حسین مرتزازی  
بررسی فعالیت زمین‌ساختی با استفاده از شاخص‌های ریخت

Hassanzadeh, J. 2006- Late Cenozoic shortening in the west-central Alborz Mountain, northern Iran, by combined conjugate strike slip and thin-skinned deformation, *Geosphere*, V.2, No.1, 35-52

29. Nazari H. Ritz J-f. Salmani r. Solaymani S. Balescu S. Michelot J-L. Ghassemi A. Talebian M. Lamothe M. and Massault M. 2007 – Paleoseismological analysis in Central Alborz, Iran. 50th Anniversary earthquake conference commemorating the 1957 Gobi-Altay earthquake (July – August 2007- Ulaanbaatar-Mongoli)

30. R. Khavari, M. Ghorashi, M. Arian, Kh. Khosrotehrani. 2008. Geomorphi signatures of Active Tectonics in the Karaj drainage Basin in south central Alborz, N Iran. *Scientific Quarterly Journal Geo sciences* vol. 19, No. 75, spring 2010. Pages 67 to 74.

31. Ritz, J.F. Balescu, S. Soleymani, S. Abbassi, M. Nazari, H. Feghhi, K. Shabanian, E. Tabassi, H. Farbod, Y. Lamothe, M. Michelot, J.L.

32. Ghanavati A, Safakish F, and Maghsoudi Y (2017) Assessment of active tectonic in the sub-basins of jarrahi-Zohre based on morphotectonic analysis and its effects on the oil fields of the study basin, *Researchers of Natural Geography*, Volume 49, No. 2, pp. 240-221

33. Ritz, J.F. Nazari, H. Ghassemi, A. Salamani, R. Shafei, A. Solaymani, S. Vernant, P. Active transtention inside Central Alborz: A new insight into the Northern Iran-Southern Caspian geodynamics, *Geology*, 34 (6), 477-480, 2006.

34. R. El Hamdouni, C. Irigaray, T. Fernandez, J. Chacon, E.A. Keller. 2007 – Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain). Received 24 January 2007; received in revised form 31 July 2007; accepted 1 August 2007, Available online 15 August 2007.

35. R. Khavari, M. Ghorashi, M. Arian, Kh. Khosrotehrani. 2008. Geomorphi signatures of Active Tectonics in the Karaj drainage Basin in south central Alborz, N Iran. *Scientific Quarterly Journal Geo sciences* vol. 19, No. 75, spring 2010. Pages 67 to 74.

36. مرتزای، حسین، پور کرمانی، محسن، الماسیان، محمود، بوذری، سهیلا، (۱۴۰۱)، ارزیابی پتانسیل حرکت گسل‌های جنبی ناحیه پردیس، فصلنامه کواترنری، صفحات ۲۴۷-۲۶۱.

فرکتال در تشخیص خطواره‌های گسلی-لرزه‌زای پنهان و روند راندگی با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک هوایی (مطالعه موردی محدوده گسل مشاء فشم)، دومین اجلاس آموزش و کاربرد ریاضیات

۱۸. شیرمحمدی، مهیا، علوی، سید علی، قاسمی، محمدرضا، احتشامی، محسن (۱۳۹۵) تحلیل ساختاری و جنبشی گستره بین گسل مشاء و گسل شمال تهران فصلنامه پژوهش‌های دانش زمین شماره ۶۲

19. Alavi, M. 1996- Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz mountain dsstgkagh in northern Iran. *Journal of Geodynamics*, V.21, 1-33.

20. El Hamdouni, C. Irigaray, T. Fernandez, J. Chacon, E.A. Keller. 2007 – Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain). Received 24 January 2007; received in revised form 31 July 2007; accepted 1 August 2007, Available online 15 August 2007.

۲۱. مرتزای، حسین، پور کرمانی، محسن، الماسیان، محمود، بوذری، سهیلا، (۱۴۰۱)، ارزیابی پتانسیل حرکت گسل‌های جنبی ناحیه پردیس، فصلنامه کواترنری، صص ۲۴۷-۲۶۱، ۲۴۷-۲۶۱.

۲۲. یآوری، علی، ده بزرگی، م، نوزعیم، رضا، حکیمی آسیا بر، س، رابطی، دنیا، (۱۴۰۰)، بیست یکمین انجمن زمین‌شناسی ایران شماره

۲۳. گلستانی، علی (۱۴۰۱)، نقش توپوگرافی بر الگوی و مورفولوژی رودخانه جاجرود، نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

۲۴. محمدی، ابوطالب و یمانی، مجتبی و مقیمی، ابراهیم و گورابی، ابوالقاسم و زمان زاده، سید محمد، (۱۳۹۹) (بازسازی تغییرات شبکه هیدرو گرافی پیرامون دماوند بر اساس داده‌های مورفومتری و رسوب‌شناسی، مقالات فصلنامه پژوهش دانش زمین، دانشگاه شهید بهشتی دوره ۱۱ شماره ۱۳۲

25. Asiabar, S. H, and Bagheriyan, S, (2017)- Exhumation of the Deylaman fault trend and its effects on the deformation style of the western Alborz belt in Iran. *International Journal of Earth Sciences*, pp 1-13.

26. Bathurst, R. J, and Zarnani, S, (2013)- Earthquake load attenuation using EPS geofom buffers in rigid wall applications. *Indian Geotechnical Journal*; 43(4), pp 283-291. Mehra

27. Ehteshami Moinabadi, M. Yassaghi, A. 2007 – Gemometry and kinematics of the Mosha fault, south central Alborz Range, Iran: An example of basement involved thrusting. *J. Asian Earth science*, Article in press.

28. Guest, B. Axen, G.J. Lam, P.S.